



← Tabule I

Vzorky spraší s biogenními a mechanickými texturami ze spodní části defilé na lokalitě Zeměchy. 1 – ohlazené plošky s paralelně orientovanými klasty slídy a náznakem striace, x 1,0; 2 – ohlazené plošky a dutý válcovitý tunel (patrně recentní stopa hmyzu), x 1,2; 3 – komůrka soliterní včely (moderní analogie ichnorodu *Celliforma*) s perforacemi po úderu zobáku šplhavce, x 4,0; 4 – šikmé průřezy válcovitých tunelů bezobratlých (?hmyzu), vyplněné kompaktní spraší, x 3,5.

1	2
3	4

← Tabule II

1–3 – západní stěny Sprašové rokle u Zeměch – stav v únoru 2002; 1, 2 – vertikální stěny dlouhodobě exponované zvětrávání jsou částečně pokryty nevýraznými, subhorizontálními římsami a žlábkami. Důlky o průměru až 10 cm a hloubce kolem 5 cm vytvářejí šplhavci (*Piciformes*) při „vytloukání“ larev hmyzu; 3 – několik komůrek soliterních včel s perforacemi po úderu zobáku šplhavce a se stopami drápů; 4 – západní stěna Sprašové rokle u Zeměch – stav v r. 1999. Povrchové škrábance jsou patrně stopy jezevce kořistícího na larvách včel.

1	2
3	4